Hướng dẫn cho bú/uống

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

S-26 GOLD® NEWBORN

	SỮA BỘT hộp thiếc 900g			SỮA NƯỚC hộp giấy 250mL
TUỔI EM BÉ	SỐ LẦN CHO UỐNG SỮA BỘT MỖI NGÀY	NƯỚC ĐUN SÔI ĐỂ NGUỘI (mL)	MUỖNG SỮA VỪA ĐẦY	LƯỢNG SỮA MỖI LẦN (mL)
0–2 tuần	7 – 9	60	1	60
2 tuần–3 tháng	6	120	2	120
3–6 tháng	5	180	3	180
Hơn 6 tháng	4 – 5	180	3	180

- Làm theo chỉ dẫn 'Cách Pha Sữa' ghi trên hộp.
- Chỉ có mục đích hướng dẫn. Em bé quý vị có thể cần bú/uống nhiều hơn hay ít hơn lượng đề nghị.
- Lý tưởng nhất là pha sữa bột ngay trước khi cho bú/uống, còn không thì cất sữa pha sẵn vào tủ lạnh và cho con bú/uống trong vòng 24 giờ.
- Nên đổ bỏ sữa còn dư trong bình hoặc ly sau khi cho con bú/uống.
- Khi em bé lớn dần, quý vị hãy hỏi ý kiến chuyên gia y tế về việc chuyển từ sữa bột Bước 1 sang Bước 2.
- Nên cho em bé ăn thức ăn đặc từ 6 tháng tuổi trở đi.

CAREline with you at every step
Want to find out more?
FREECALL Australia 1800 552 229

Pfizer Nutrition, division of Pfizer Australia Pty Limited ABN 50 008 422 348
This page has been downloaded from the Pfizer Nutrition website
Pfizer Nutrition

PN-20120346-4/04/2012

Cách pha

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

Luôn luôn rửa và lau khô tay trước khi pha sữa.

Rửa bình, núm vú, nắp đậy và dao.

Sau khi rửa, đun sôi trong 5 phút để khử trùng. Đậy nắp bình lại cho đến khi cần sử dụng.

SỮA BỘT hộp thiếc 900g

1. Đun sôi nước uống sạch trong 5 phút. Để nguội.
2. Đổ nước đun sôi để nguội vào bình sữa.
3. Sử dụng muỗng có sẵn trong hộp múc đầy muỗng sữa bột S-26 GOLD® NEWBORN và lấy dao đã khử trùng gạt bằng miệng muỗng. Luôn luôn pha 1 muỗng sữa bột (8,3g) với mỗi 60mL nước.
4. Đậy nắp bình sữa hoặc ly rồi lắc hay khuấy. Quý vị nên thử nhiệt độ sữa ở cổ tay trước khi cho con bú/uống. Phải đổ bỏ sữa còn dư trong bình sau khi cho con bú/uống.

SỮA NƯỚC hộp giấy 250mL

1. Lắc thật đều hộp sữa nước S-26 GOLD NEWBORN còn nguyên chưa mở.
2. Cắt hoặc xé miệng hộp.
3. Đổ lượng sữa cần thiết vào bình sữa rồi đậy nắp lại. Đổ bỏ sữa còn lại trong hộp cũng như sữa còn dư trong bình sau khi cho con bú.

- Pha từng bình một.
- Lý tưởng nhất là pha sữa bột ngay trước khi cho con bú/uống, còn không thì cất sữa pha sẵn vào tủ lạnh và cho con bú/uống trong vòng 24 giờ.

CAREline with you at every step

Want to find out more?
FREECALL Australia 1800 552 229

Pfizer Nutrition, division of Pfizer Australia Pty Limited ABN 50 008 422 348
This page has been downloaded from the Pfizer Nutrition website
Pfizer Nutrition

PN-20120346-4/04/2012